



Commune de Dirac

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Dirac un recouvrement boisé important, des zones humides patrimoniales incluses en zone Natura 2000 et des parcelles de pelouses calcaires riches en plantes méditerranéennes. La faune est également bien présente et très diversifiée. Loutre, chauves-souris, oiseaux forestiers, papillons et Orthoptères sur les pelouses et les prairies, des libellules, cette richesse spécifique étant l'une des plus importantes de l'agglomération. Elle nécessite une attention particulière.

Propositions d'objectifs prioritaires

- Conserver les habitats remarquables
- Adapter la gestion des boisements et des landes aux espèces remarquables présentes
- Renforcer le corridor Pelouses
- Maintenir la végétation rivulaire et la circulation des cours d'eau
- Limiter l'extension de l'urbanisation

La vallée de l'Anguienne sur la commune de Dirac, au Châtelard, abrite une très belle station d'Epipactis des marais ©Jean-Pierre Sardin




Cartographie des habitats


ABI GrandAngoulême - Commune de Dirac




- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Limite communale | <i>Carrières et milieux rocheux</i> | <i>Milieux humides</i> | <i>Boisements</i> |
| Cours d'eau | Carrière | Bas-marais alcalin | Feuillus / mixtes |
| Pelouse calcicole | Falaise | Forêt alluviale | Résineux |
| Zone urbanisée | | Mégaphorbiaie | Lande |
| | | Milieux aquatiques stagnants | |
| | | Phragmitaie | |
| | | Prairie humide atlantique | |




Limites communales	Dactylorhize incarnat	Nerprun des rochers	Sabline des chaumes
Crapaudine de Guillon	Globulaire commune	Odontite de Jaubert à fleurs dorées	Thésion divariqué
Crucianelle à feuilles étroites	Hornungie des pierres	Potamot coloré	Épipactis des marais




-  Limites communales
-  Campagnol amphibie
-  Loutre d'Europe





Limites communales	Grand Rhinolophe	Murin de Natterer	Murin à oreilles échancrées	Oreillard indéterminé	Pipistrelle commune
Barbastelle d'Europe	Minioptère de Schreibers	Murin indéterminé	Noctule de Leisler	Oreillard roux	Pipistrelle de Kuhl
Grand Murin	Murin de Daubenton	Murin à moustaches	Oreillard gris	Petit Rhinolophe	Sérotine commune




Limites communales	Chardonneret élégant	Cisticole des joncs	Alouette lulu	Râle d'eau
Martin-pêcheur d'Europe	Verdier d'Europe	Pic épeichette	Mésange noire	Serin cini
Héron pourpré	Circaète Jean-le-Blanc	Pic noir	Bondrée apivore	Tourterelle des bois
Engoulevent d'Europe	Busard Saint-Martin	Bruant Jaune	Bouvreuil pivoine	




- | | | | |
|--|--|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre verte et jaune |  Couleuvre helvétique |  Lézard des murailles |
|  Cistude d'Europe |  Lézard à deux raies (L. vert occidental) |  Couleuvre vipérine |  Couleuvre d'Esculape |





-  Limites communales
-  Chlorocordulia à taches jaunes
-  Agrion de Mercure
-  Leste fiancé



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- | | | |
|---|---|---|
|  Limites communales |  Azuré de la sanguisorbe |  Azuré du serpolet |
|  Argus frêle |  Azuré des cytises |  Cuivré des marais |



 Limites communales  Lucane cerf-volant